

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER GATTUNG
LYCOPodium

STUDIEN ÜBER DIE UNTERGATTUNG UROSTACHYS

TEIL I (ABSCHNITT I BIS VI)

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

GENEHMIGT

VON DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DER


FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT

ZU BERLIN

VON

WILHELM HERTER

AUS BERLIN



Tag der Promotion: 23. September 1908.

Referenten:

Geheimrat Professor Dr. A. ENGLER.

Geheimrat Professor Dr. S. SCHWENDENER.

Mit Genehmigung der hohen Fakultät kommt hier nur der erste Teil der ganzen Arbeit zum Abdruck. Der Rest, Abschnitt VII—XI, wird in ENGLERS Botanischen Jahrbüchern Bd. XLIII, Beiblatt 98 (1908) erscheinen.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

I. Einleitung.

Eine besondere Vorliebe für die *Lycopodiales* bewog mich im Frühjahr 1905 während meines Aufenthaltes in Paris, am Musée d'Histoire Naturelle mich eingehender mit dieser Klasse des Pflanzenreiches zu beschäftigen.

Es zeigte sich bald, daß im Laufe der Zeit eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Bestimmungsirrtümern in die Herbarien und besonders in die Florenwerke eingedrungen waren. Da außerdem eine große Fülle von neu eingetroffenem Herbarmaterial der Bestimmung oder Neubeschreibung harrete, so war es notwendig, zunächst an eine systematische Bearbeitung der Gruppe zu gehen.

Von Herbarien, die ich einzusehen Gelegenheit hatte, sind die wichtigsten:

Herb. Basel Botan. Institut Botan. Garten Spalenter. **Basel.**

Herb. Berl. K. Botan. Garten und Museum Dahlem-Steglitz bei **Berlin.**

Herb. Boiss. a) Herb. Barbey-Boissier, b) Herb. général, Rue de Lausanne
Chambésy-Genève.

Herb. Brit. British Museum. Nat. Hist. Mus. South-Kensington **London.**

Herb. B. Aires División de Agricultura. Viamonte, **Buenos Aires.**

Herb. Decandolle Rue St. Pierre **Genève.**

Herb. Delessert Rue de Lausanne, Ariana bei Chambésy, **Genève.**

Herb. Drake Rue Balzac n. 2 **Paris.**

Herb. Freiburg B. Bertholdstraße inkl. Herb. Ayasse **Freiburg i. B.**

Herb. Genève Institut de Botanique Université **Genève.**

Herb. Kew Kew Gardens bei **London.**

Herb. Lausanne Institut de Botanique a) Herb. Wilczek, b) Herb. général.
Université **Lausanne.**

Herb. Montevideo Museo Nacional. Teatro Solis **Montevideo.**

Herb. Montpellier Institut de Botanique. Jardin des Plantes. **Montpellier.**

Herb. Par. Musée d'Histoire Naturelle. a) Herb. général incl. Herb. de Bory de St. Vincent etc. b) Herb. Lamarck. c) Herb. de France. Jardin des Plantes. **Paris.**

Herb. Pet. K. Bot. Garten u. Museum. Apothekerinsel. **St. Petersburg.**

Herb. Rio Jan. Museu Nacional **Rio de Janeiro.**

Herb. Straßb. Bot. Inst. Universität **Straßburg i. E.**

Im folgenden sind die ersten Ergebnisse meiner Studien zusammengefaßt. Ich beschränke mich auf die Lycopodiaceen-Untergattung *Urostachys*. Der umfangreichere systematische Teil wird in der Dissertation nicht zum Abdruck gelangen. Die vorliegende Arbeit wurde zum größten Teil im Kgl. Botan. Museum zu Steglitz-Dahlem angefertigt.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, allen, die mich bei meinen Studien unterstützten, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Prof. Dr. ENGLER bin ich für seine wertvollen Ratschläge zu ganz besonderem Danke verpflichtet.

II. Geschichtliches.

PLINIUS, Hist. Nat. XXIV. cap. LXII, führt unter dem Namen *Selago* eine *Juniperus*-ähnliche Pflanze an, die wohl mit Sicherheit als eine unserer *Lycopodium*-Arten betrachtet werden darf.

Erst bei DODOENS (DODONEUS, † 1585) scheint der Name *Lycopodium* aufzutreten, und zwar nicht für unser *L. selago*.

JOH. THAL, Harcynia Saxonothuringica 1588, p. 145—146, unterscheidet 3 *Selago*-Spezies aus dem Harz, wovon vermutlich die dritte *L. selago* vorstellen soll.

TABERNAEMONTANUS, Kräuterbuch II. 1613, p. 545—547, bildet *L. clavatum* unter dem Namen »Katzenleiterlein« (p. 548, fig. III) ab. Unter den Synonymen führt er den Namen *Lycopodium* an. Erst in der Ausgabe von 1687 findet sich auch der Name *Selago* für dieselbe Pflanze. Er nennt die Fruchststände seines *Lycopodium*, die Keulen (clavae), Ähren (spicae) oder Kätzchen (amenta) der späteren Autoren, »Blüten« oder »Zäpflein«. Von diesem einzigen ihm bekannten *Lycopodium* unterscheidet er zwei andere »Beerlappmoose«, die wohl Selaginellen darstellen.

JACOBUS BREYN, Centuria Cap. 92, p. 180 (sec. Dillen) 1678, stellt Lycopodien, darunter *L. phlegmaria*, sowie Selaginellen zur Gattung *Selago*.

LINNÉ, Flora lapponica, 1737, faßt Lycopodien und Selaginellen unter dem Gattungsnamen *Lycopodium* zusammen; den Namen *Selago* hatte er bereits vorher (Syst. ed. 1 1735) für ein Scrophulariaceen-Genus verwendet.

DILLENIUS, Hist. muscorum, p. 435—474; 549—550 1741, versucht

als erster eine Gliederung der Lycopodien in mehrere Gattungen. Er unterscheidet vier Genera: *Selago*, *Lycopodium*, *Selaginoides* und *Lycopodioides* mit insgesamt etwa 32 Arten. Von diesen gehören zur heutigen Lycopodiaceen-Untergattung *Urostachys*:

Tab.	LVI 4 A et B	<i>Selago vulgaris</i>	Europa	= <i>L. selago</i> Typus
»	LVI 4 C	<i>Selago vulgaris</i>	Nordamerika?	= <i>L. lucidulum</i> ?
»	LVI 4 D	<i>Selago vulgaris</i>	Grönland	= <i>L. selago</i> Var.
»	LVI 2	<i>Selago americana</i>	Nordamerika	= <i>L. lucidulum</i>
»	LVI 3	<i>Selago foliis Camphoratae</i>		= <i>L. verticillatum</i>
»	LVII 4	<i>Selago coridis foliis reflexis</i>	Westindien?	= <i>L. reflexum</i> ?
»	LVII 5	<i>Selago Linariae foliis</i>	Westindien?	= <i>L. linifolium</i>
»	LXI 5	<i>Lycopodium erectum</i>	Ostindien	= <i>L. phlegmaria</i>
»	LXXXIV 43 (App.)	<i>Selago indica</i>	St. Helena?	= <i>L. saururus</i> .

Zu den übrigen Untergattungen gehören:

Tab.	LVIII 4	<i>Lycopodium vulgare</i> = <i>L. clavatum</i>
»	LIX 2—4	<i>Lycopodium sabiniae facie, digitatum et altissimum</i> = <i>L. complanatum</i>
»	LXII 6	<i>Lycopodium pinnatum</i> = <i>L. carolinianum</i>
»	LXII 7	<i>Lycopodium palustre</i> = <i>L. inundatum</i>
»	LXII 8	<i>Lycopodium alopecuroides</i> = <i>L. alopecuroides</i>
»	LXIII 9	<i>Lycopodium elatius</i> = <i>L. annotinum</i>
»	LXIII 40	<i>Lycopodium frutescens</i> = <i>L. cernuum</i>
»	LXIII 44	<i>Lycopodium rupestre</i> = <i>L. alpinum</i> ?

Zu den Selaginellen gehören:

Tab.	LXIV 2 u. 3	<i>Lycopodioides denticulatum pulchrum</i>
»	LXV 4	<i>Lycopodioides frutescens</i>
»	LXV 5	<i>Lycopodioides dentatum erectum</i>
»	LXV 6	<i>Lycopodioides erectum</i>
»	LXV 7	<i>Lycopodioides denticulatum erectum</i>
»	LXVI 8	<i>Lycopodioides Lonchitidis</i>
»	LXVI 9	<i>Lycopodioides dichotomum taxiforme</i>
»	LXVI 10	<i>Lycopodioides dentatum dichotomum</i>
»	LXVI 44	<i>Lycopodioides squamosum</i>
»	LXVI 4 A	<i>Lycopodioides imbricatum</i>
»	LXVI 4 B	<i>Lycopodioides repens</i>
»	LXVIII 4	<i>Selaginoides foliis spinosis</i> .

Die vier »*Musci exotici incogniti*« (p. 474) lassen sich nicht mit Sicherheit identifizieren.

DILLEN trennt also die Selaginellen von den Lycopodien und faßt unter den letzteren bereits die meisten der heute zu *Urostachys* gehörigen Arten als *Selago* zusammen. Die übrigen Lycopodien stellt er zur Gattung *Lycopodium*. Nur *L. phlegmaria* steht der Ähren (spicae) wegen bei *Lycopodium* und nicht bei *Selago*; dieser Auffassung sind bis in die neueste Zeit alle Autoren mit Ausnahme PRITZELS gefolgt.

Dieser ausführlichen Bearbeitung der Lycopodiaceen gegenüber ist es verwunderlich, daß LINNÉ auch in seinen späteren Werken, z. B. Spec.

Plant. ed. 1 1753 und ed. 2 1763 Lycopodien und Selaginellen — deren er nur 24 kennt — in einer Gattung beläßt. Auch WILLDENOW, Spec. Plant. ed. 5 1810, behält die Gattung im LINNÉschen Sinne bei. Sie enthält bei ihm 92 Arten.

Bei ADOLPHE BRONGNIART, Hist. Vég. Joss. II. 2 1828, wird die Gattung *Lycopodium* zum ersten Male in dem heute gebräuchlichen Sinne gefaßt.

Die erste moderne Bearbeitung der Lycopodien publizierte A. SPRING, Monographie de la famille des Lycopodiacees in Mém. Ac. Roy. de Bruxelles. 1^{re} partie 1842, 2^{de} partie 1849. SPRING faßt mit BRONGNIART die beiden DILLENSchen Gattungen *Selago* und *Lycopodium* als Genus *Lycopodium* zusammen und stellt sie den DILLENSchen Gattungen *Selaginoides* und *Lycopodioides*, die sein Genus *Selaginella* bilden, gegenüber. Als Haupteinteilungsprinzip behält er die DILLENSchen Gattungen bei:

Sect. 1. Antheridiis sparsis. *Selago* Dillen.

Sect. 2. Antheridiis in amenta congestis. *Amentacea* Spring. *Lycopodium* Dillen.

Aus der Bezeichnung »Antheridien« statt »Sporangien« ersieht man, welche Unklarheit in jener Zeit über die Sexualität der Pteridophyten herrschte.

Die erste Sektion umfaßt 8, die zweite 9 Gruppen. Die beiden ersten Gruppen der *Amentacea*, *Phlegmaria* und *Ophioglossoides* — Sect. *Phlegmariurus* m. — unterscheiden sich bei SPRING von den übrigen Gruppen der Sektion durch gegabelte Kätzchen (*amenta*); sie stehen also gleichsam in der Mitte zwischen beiden Sektionen.

Einen Rückschritt bedeutet die Einteilung, die BAKER, Handbook of the Fern-Allies, London 1887, gibt. Er schachtelt die Gruppe *Phlegmaria* (Sect. *Phlegmariurus* m.) zwischen die Gruppen *Inundatum* und *Cernuum* ein.

DILLENUS ließ sich allein durch die äußere Ähnlichkeit der Sporophyllstände dazu verleiten, *L. phlegmaria* in den Verwandtschaftskreis des *L. clavatum*, *inundatum* usw. zu stellen. SPRING und BAKER wurden in dieser Auffassung noch durch die irrtümliche Ansicht bestärkt, daß eine Übergangsform zwischen den aufrechten und hängenden Arten einerseits und den kriechenden andererseits existiere.

SPRING beschreibt nämlich in seiner Monographie II. p. 34 unter 64^b eine neue Art, *L. eruentum*, die zwar *L. selago* sehr ähnlich sähe, aber wegen der (angeblich) kriechenden Achse zur Gruppe *Inundatum* gehöre. Sie sollte von PURDIE (Herb. Hooker) und MORITZ (Herb. Berl.) in Colombia gesammelt worden sein. BAKER scheint die Original-exemplare SPRINGS gesehen zu haben und stellt die Art zwischen *L. compactum* und *L. selago*, glaubt aber, daß sie ein Mittelglied zwischen der *Selago*- und der *Inundatum*-Gruppe darstelle.

Wie ich im Herb. Kew an den von SPRINGS Hand bezeichneten Exemplaren feststellen konnte, handelt es sich um zwei verschiedene Arten. Ich behalte für die Pflanze PURDIES den Namen *L. eruentum* bei, die zweite von MORITZ in Venezuela (nicht Colombia!) gesammelte nenne ich *L. venezuelanicum*. Die erstere steht *L. selago*, die zweite *L. compactum* sehr nahe. Beide Arten zeigen die auch bei anderen geophytischen *Urostachys*-Arten, z. B. *L. selago*, *L. saururus*, zu beobachtende Eigentümlichkeit,

am Grunde zuerst etwas niederzuliegen und erst dann aufrecht zu wachsen. Eine Verwandtschaft mit *L. inundatum* scheint mir ausgeschlossen.

E. PRITZEL, *Lycopodiaceae*, in Engl. Nat. Pflanzenfam. I. 4 Berlin 1900, erkannte zwar die Zugehörigkeit der *Phlegmaria*-Gruppe zu SPRINGS Sect. 4 (*Selago* Dillen), die er als Untergattung 1. *Urostachya* den übrigen Arten (Untergattung 2. *Rhopalostachya*) gegenüberstellt, versetzte aber leider das ominöse *L. cruentum* wieder wie SPRING in die *Inundatum*-Gruppe, da er »an ihm wie auch an einigen wahren Arten aus dieser Gruppe eine Annäherung an die einfacher gebauten Typen der *Urostachya*, *L. selago* usw.« bemerkt.

Die Untergattung *Urostachys*, wie ich sie nenne, enthält in der Umgrenzung, die ich ihr gebe, folgende Arten:

1. Bei SPRING sämtliche Spezies der Sect. 4 (*Selago*) und die beiden ersten Gruppen (*Phlegmaria* und *Ophioglossoides*) sowie *L. cruentum* der Sect. 2 (*Amentacea*) insgesamt 65 Arten.

2. Bei BAKER sämtliche Spezies der Untergattungen 1 (*Selago*) und 2 (*Subselago*), sowie die Gruppe *Phlegmaria* aus der Untergattung 3 (*Lepidotis*) insgesamt 68 Arten.

3. Bei PRITZEL sämtliche Arten der Untergattung 1 (*Urostachya*) sowie *L. cruentum* aus der Untergattung 2 (*Rhopalostachya*) insgesamt etwa 100 Arten.

Im folgenden werden 140 Arten behandelt, wovon mehr als der dritte Teil neue Spezies darstellen.

Allgemeiner Teil.

III. Für die Systematik verwendbare Merkmale.

Über die Ontogenie der *Urostachys*-Arten ist bisher wenig bekannt geworden. Es ist noch nicht geglückt, Sporen zum Wachstum zu bringen. Vielleicht ist bereits bei der Keimung die Anwesenheit des später im Prothallium tätigen Endophyten erforderlich. Die bis jetzt untersuchten Prothallien der Arten *L. selago*, *hippuris* (= *squarrosus*?), *carinatum* und *nummulariifolium* bieten so viel Analogien untereinander, daß sie auch abgesehen von der Schwierigkeit, sie zu beschaffen, wohl keine systematischen Kennzeichen liefern. Die Prothallien der Epiphyten zeichnen sich höchstens durch üppigeres Wachstum von dem des Geophyten *L. selago* aus.

Von großer Bedeutung für die Charakterisierung des Subgenus *Urostachys* gegenüber den anderen *Lycopodiaceen* ist dagegen die Art der Verzweigung. Es ist eine alte Streitfrage, ob die Verzweigung der *Lycopodiales* als echte Dichotomie gelten darf oder nicht. Da es über den Rahmen der Arbeit hinausgehen würde, die Frage eingehend zu behandeln,

so beschränke ich mich hier darauf, kurz meine Ansicht darzulegen, und behalte mir vor, den Gegenstand später genauer zu erörtern¹⁾.

Bei gewissen Algen geht die Verzweigung bekanntlich in der Weise vor sich, daß eine Scheitelzelle sich in zwei Teile spaltet und jede der Teilzellen zu einem neuen Sproß auswächst. Der ursprüngliche Vegetationspunkt geht verloren. Nach NAEGLI darf nur diese Art der Verzweigung als Dichotomie bezeichnet werden.




Fig. 4. Übergang der Dichotomie bzw. Bipartition mit gleichmäßiger Weiterentwicklung (Dichotomie im engeren Sinne, Dichopodium Velenovský, a) in die mit ungleichmäßiger Weiterentwicklung (Sympodium, Pseudomonopodium, d).

Die beiden anfangs gleich starken Sprosse wachsen entweder auch in der Folgezeit gleichmäßig weiter, oder der eine Sproß entwickelt sich kräftiger als der andere, so daß ein Verzweigungssystem zustande kommt, das äußerlich an das der Siphonogamen erinnert. Im ersteren Falle (cf. Fig. 1a) liegt Dichotomie im engeren Sinne vor, im letzteren Falle (cf. Fig. 1d) spricht man von einem (dichotomischen) Sympodium oder einem Pseudomonopodium. Ich möchte die beiden

Verzweigungsarten, einem Vorschlage des Herrn Geh. Rat SCHWENDENER folgend, als Dichotomie mit gleichmäßiger und un-


gleichmäßiger Weiterentwicklung bezeichnen²⁾.

Die Siphonogamen verzweigen sich derart, daß der Vegetationspunkt erhalten bleibt und unterhalb desselben, meist aus den Achseln der Blätter, neue Sprosse³⁾ hervorkommen. So entsteht ein Monopodium.

1) Herr Geh. Rat ENGLER war so liebenswürdig, mich auf die Behandlung dieser Frage durch VELENOVSKÝ aufmerksam zu machen. Dieser Autor (Vergleichende Morphologie Bd. I. Prag 1905) behandelt mit größter Schärfe die vielen in der Literatur sich vorfindenden Angaben über diesen Gegenstand. Es soll daher hier nicht näher darauf eingegangen werden.

2) VELENOVSKÝ (l. c. p. 246) bezeichnet das dichotomische sowie das unter 2b (cf. p. 9) besprochene bipartite Sympodium — also nur Dichotomie und Bipartition mit ungleichmäßiger Weiterentwicklung — als Dichopodium; PAX versteht unter diesem Namen jede Art von Dichotomie und Bipartition.

3) Ich fasse den Ausdruck Sproß in folgender Weise:



Den Übergang zwischen diesen beiden Verzweigungssystemen stellen die Pteridophyten dar. Hier kommen drei Möglichkeiten vor:

1. Dichotomie aus einer Scheitelzelle (Dichotomie NÆGELI). Hierher gehört eine Anzahl von *Filicales* sowie einige *Selaginellaceae*.

2. Am Vegetationskegel findet sich ein Komplex von Zellen (Urmeristem). Bei beginnender Verzweigung wird an zwei Stellen des Zellgewebes gleichzeitig das Wachstum beschleunigt. Hier sprossen zwei zunächst gleichwertige Glieder hervor. Der ursprüngliche Vegetationskegel stellt sein Wachstum ein. Diese Art der Verzweigung ist von vielen Autoren als Dichotomie bezeichnet worden. Wenn man an der NÆGELISCHEN Definition festhalten will, so müßte man einen neuen Namen wählen und könnte sie etwa Bipartition nennen. Sie kommt bei einer Anzahl von *Filicales* und *Selaginellaceae* vor, ist aber vor allem für die *Psilotaceae*, *Lycopodiaceae* und *Isoëtaceae* charakteristisch.

Innerhalb der Gattung *Lycopodium*, die uns hier näher interessiert, kommen analog den beiden oben bei der Dichotomie der Algen angedeuteten Möglichkeiten zwei Fälle vor:

a) Die (bipartite) Verzweigung bleibt stets in größter Regelmäßigkeit erhalten (Fig. 4 a). Dies ist die ausschließliche Verzweigungsweise der Arten des Subgenus *Urostachys*. Sie würde als Bipartition mit gleichmäßiger Weiterentwicklung zu bezeichnen sein.

b) Die anfangs gleichmäßige (bipartite) Verzweigung wird in der Weise modifiziert, daß der eine Tochtersproß kräftiger als der andere zur Entwicklung kommt und in die Richtung des Muttersprosses tritt. So entsteht ein (bipartit-)dichotomisches Sympodium oder Pseudomonopodium (Fig. 4 d). Dies ist der Fall sämtlicher *Rhopalostachya*. Diese Art der Verzweigung wäre als Bipartition mit ungleichmäßiger Weiterentwicklung zu bezeichnen ¹⁾.

3. Monopodiale Verzweigung wie bei den Siphonogamen. Hierher gehören die *Equisetales*, deren quirliges Monopodium jedoch durch den Mangel eines Stützblattes von dem der Siphonogamen abweicht. Die Frage, ob dieses Verzweigungssystem auch bei anderen Pteridophyten vorkommt, wage ich nicht zu entscheiden ²⁾.

In der folgenden Übersicht sind diese Arten der Verzweigung zusammengestellt.

Die Wurzeln der *Urostachys*-Arten liefern keine systematischen Merkmale. Sie behalten wie die Stammteile bis ins Alter hinein die gleichmäßige Bipartition bei. Im Einklange mit der aufrechten oder hängenden Lebensweise der Arten unseres Subgenus bilden sie sich in der Regel nur am Ausgangspunkte der Pflanze. Die Wurzeln der Geophyten dringen

¹⁾ cf. Anmerkung 2 p. 8.

²⁾ VELENOVSKÝ verneint sie auf das entschiedenste.

Dichotomie der meisten Autoren (Dichopodium Pax)

Monopodium der meisten Autoren

A.		B.		a.	b.
Dichotomie mit einer Scheitelzelle (Dichotomie Naegeli)		Dichotomie mit Scheitelzellenkomplex (Bipartition)			
a.	b.	a.	b.	a.	b.
D. mit gleichmäßiger Weiterentwicklung	D. mit ungleichmäßiger Weiterentwicklung (Sympodium ¹ , Dichopodium Velenovský)	D. (B.) mit gleichmäßiger Weiterentwicklung	D. (B.) mit ungl. Weiterentw. (Sympodium ¹ , Dichopodium Velenovský)	M. ohne Stützblatt, quirliges M.	M. mit Stützblatt
Thallophyten <i>Fucales</i> <i>Selaginellaceae</i>	Thallophyten <i>Fucales</i> <i>Selaginellaceae</i>	<i>Fucales</i> <i>Selaginellaceae</i> <i>Lyceopodiaceae</i> <i>Psilotaceae</i> <i>Isoëtaceae</i>	<i>Fucales</i> <i>Selaginellaceae</i> <i>Lyceopodiaceae</i> <i>Psilotaceae</i> <i>Isoëtaceae</i>	<i>Equisetales</i>	Siphonogamen
					Siphonogamen

Innerhalb der Gattung *Lyceopodium*:

Ba.	Bb.
Subgenus I (<i>Urostachys</i>) Subg. II—VII (<i>Rhopalostachya</i>) junge Teile	Subg. II—VII (<i>Rhopalostachya</i>) alte Teile

büschelig etwa 10 cm weit nach allen Richtungen im Erdreich vor, während die der Epiphyten oft 20 cm lang von den Bäumen herabhängen, um mit Hilfe der dichten Haarbekleidung die atmosphärische Feuchtigkeit aufzunehmen. Die Wurzeln der kriechenden und kletternden Lycopodien (*Rhopalostachya*) finden sich an Haupt- und Nebenachsen in regelmäßigen Abständen, nie büschelig am Ende der Pflanze. Ein ähnliches Verhalten zeigen in Ausnahmefällen auch *Urostachya*, wenn früher oberirdische Teile im Laufe der Jahre von Humus bedeckt worden sind. Durch dieses Verhalten haben sich, wie oben erwähnt, die Monographen verleiten lassen, das ihnen nur ungenau bekannte *L. cruentum* zu den *Rhopalostachys*-Arten zu rechnen.

Anatomisch zeigen die Wurzeln aller Arten den gleichen Bau. Ein großes, zentrales, geschlossenes Leitbündel mit unregelmäßig verteilten Xylem- und Phloëmkomplexen wird von einem Mantel parenchymatischer Rindenzellen umgeben. Wurzelhaare sind reichlich vorhanden. Ein Endophyt konnte nicht nachgewiesen werden.

Die größten, systematisch verwendbaren Verschiedenheiten weisen die Stammteile der einzelnen Arten auf. Der Stamm gliedert sich in einen vegetativen (sterilen) und in einen reproduktiven (fertilen) Teil. Ersterer zerfällt in die vegetative Achse und in die eigentlichen Blätter, letzterer in die reproduktive Achse und in die sporangientragenden Blätter oder Sporophylle. Bei den *Eurostachys*-Arten ist der Unterschied zwischen den beiden Teilen äußerlich wenig ausgeprägt, man kann hier die Stammteile zusammenfassend als »Frons« bezeichnen. Bei *Heterourostachys* dagegen hebt sich der reproduktive Teil von dem vegetativen deutlich ab; er wird dann als Sporophyllstand oder als Blüte bezeichnet. Von den Blüten (= Keulen, Ähren, Kätzchen, Zäpfchen) der übrigen Untergattungen unterscheidet er sich dadurch, daß er ebenso breit oder schmaler als der vegetative Teil und wie dieser oft gegabelt ist.

Je nachdem die beiden Stammteile sich äußerlich nicht abheben, allmählich ineinander übergehen oder scharf abgegrenzt sind, unterscheidet man die drei Hauptgruppen der Untergattung *Urostachys*: *Euselago*, *Subselago* und *Phlegmariurus*, die in Fig. 2 schematisch dargestellt sind. Der vielen Zwischenformen halber ist es in der Praxis oft schwer möglich, die Zugehörigkeit einer Art zu einer dieser drei Abteilungen zu entscheiden, doch ist die Einteilung der *Urostachya* in

I. *Geophyta*,

II. *Epiphyta*

noch weniger glücklich. Übrigens leben die Arten der Sektionen 1 und 2 fast ausschließlich geophytisch, die der Sektionen 3—7 epiphytisch, so daß die beiden Einteilungen zu der gleichen Gruppierung der Arten führen würden.

Die Achse der *Urostachya* ist bald aufrecht, bald aufsteigend, bald hängt sie in den oberen Teilen, bald völlig herab. Die aufrechten Arten sind gewöhnlich Geophyten, die hängenden Epiphyten, doch kommen alle Übergänge vor (z. B. Series *Reflexa*). Die Achse der Epiphyten ist sehr reich, oft bis 20mal, gegabelt, während bei den Geophyten die zu oft wiederholte Zweiteilung zum Überhängen der Zweigenden und schließlich zum Auseinanderfallen der ganzen Pflanzen führen muß. So kommt es, daß ältere Exemplare von *L. sinense* sternförmig ausgebreitet am Boden liegen. Gänzlich ungegabelte Arten kommen nicht vor; bei *L. selago* zählte ich bis 8malige Bipartition als Maximum für die Geophyten. Durchschnittlich sind diese 2—3mal, Epiphyten 6—8mal gegabelt. Auch Größe, Stärke und Form der Achse ist als Artmerkmal von Bedeutung. Von Geophyten erreicht nur *L. trencilla* die beträchtliche




Fig. 2. Schematische Darstellung der Stammteile in 3 Abteilungen der *Urostachya*. a u. b *Eurostachys*, c *Hetero-urostachys*. — a *Euselago* (Sect. I—V), b *Subselago* (Sect. VI *Carinaturus*), c *Phlegmariurus* (Sect. VII).

Höhe von 70 cm; sonst sind Geophyten durchschnittlich 10—20 cm hoch. Die Epiphyten werden 30—300 cm lang. Die stärksten Arten finden sich unter den Geophyten. So ist die Achse von *L. trencilla* 12—14 mm dick. Epiphyten besitzen gewöhnlich eine dünne, biegsame Achse, doch sind auch sie in der Jugend oft recht robust gebaut. Man sieht es den dicken, spargelähnlichen Schossen von *L. fontinaloides*, das ich in Kew kultiviert fand, nicht an, daß sie später als biegsame Fäden herabhängen. Auch *L. phlegmaria* und Verwandte zeigen im Anfang einen für

Epiphyten merkwürdig kräftigen

Wuchs. Der Querschnitt der Achse ist bei den robusten Arten oft vier- oder mehrreigig, was jedoch in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen vorkommt und nur mit anderen Charakteren als Artmerkmal gelten darf. Wichtiger als der Durchmesser der Achse ist der Gesamtdurchmesser der Stammteile, sowohl der vegetativen, wie der reproduktiven. Man findet diesen in der Weise, daß man sich die Blattspitzen untereinander verbunden denkt und nun den Durchmesser des so entstandenen Zylinders mißt. Der Gesamtdurchmesser des vegetativen Teiles beträgt:

in der Sect. I	durchschnittlich	40 mm
» » » II	»	40 »
» » » III	»	2—6 »
» » » IV—VII	»	15 »

Den größten Durchmesser besitzen die Geophyten *L. serratum* mit über 50 mm (Sect. I), *L. trencilla* mit 30 mm (Sect. II), ferner der Halbepiphyt *L. gigas* mit 50 mm (Sect. IV), sonst kommen unter den Epiphyten der Sect. IV—VII 30 mm Gesamtdurchmesser häufig vor. Die schmalste Art ist *L. tenue* (Sect. III) mit selten mehr als 4 mm breiten Stammteilen.

Anatomisch bieten die Achsen der einzelnen Arten sehr geringe Unterschiede. Innerhalb der stets mit starker Cuticula versehenen Epidermis findet sich oft stark entwickeltes sklerenchymatisches Gewebe. Es ist dies wohl als Festigungselement im Sinne SCHWENDENERS aufzufassen. Besonders bei den tropophilen Geophyten (cf. p. 18 u. 49) sind solche mechanischen Ringe schön ausgebildet (Fig. 3). Im Zentrum befindet sich ein geschlossenes Leitbündel, das ebenfalls von Sklerenchymfasern umgeben ist. Die Xylem- und Phloënteile liegen bei den Epiphyten, z. B. bei *L. phlegmaria*, zu vielen kleinen Strängen unregelmäßig innerhalb des Leitbündels zerstreut, bei den Geophyten, z. B. *L. selago*, zu wenigen größeren Strängen vereinigt. Je dichter die Blätter stehen, um so mehr Blattspurstränge werden auf einem Querschnitt zwischen Stammstrang und Epidermis angetroffen (Fig. 3).

Ebenso wertvolle Sektions- und Artmerkmale wie die Achse liefern die Blätter. Die Blattstellung variiert zwar oft an demselben Exemplar — SCHIMPER, *Traité de Paléontologie Végétale*, Paris 1869 p. 399, fand bei *L. selago* die Stellungen $\frac{2}{7}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{2}{11}$, $\frac{2}{12}$ —, doch ist sie in anderen Fällen wieder sehr konstant, so bei *L. tetragonum*, *L. phlegmarioides* u. a. Von Wichtigkeit ist es dann, ob die Blätter dicht oder spärlich gestellt sind, ob sie die Achse bedecken oder nicht, ob sie aufrecht gerichtet, schuppenartig angepreßt oder abstehend oder abwärts gerichtet sind. Ferner ist die Textur der Blätter systematisch sehr bedeutsam. Sie können fleischig, dick, hart, starr, lederig, dünn, biegsam, zart oder schlaff sein. Nach ihrer Gestalt unterscheidet man haarförmige, pfriemliche, coniferennadelartige, lineare, lanzettliche, säbelförmige, dreieckige, eiförmige oder kreisrunde Blätter, ferner gerade oder gekrümmte, flache oder gewölbte, oberseits oder unterseits eingerollte oder ferner solche mit ungezähntem, gezähntem oder gewimpertem Rande usw. Die Blattgröße ist ebenfalls bei den einzelnen Arten oft konstant. Die Breite der Blätter schwankt zwischen 0,2 und 40, die Länge zwischen 4 und 40 mm. Die größten Blätter besitzen *L. serratum* (bis 4×40 mm), *L. trencilla* (10×42 mm), *L. gigas* ($1,5 \times 30$ mm). Im Durchschnitt beträgt die Blattgröße 4×40 mm. Zu dorsiventraler Blattstellung, die bei vielen Arten der Untergattungen *Complanatum* und *Inundatum* — ich rechne *L. carolinianum* zu der letzteren — ausgeprägt ist, neigt bereits *L. phlegmarioides*. Bei dieser Art sind die Blätter der zwei oberen (vorderen) Reihen etwas kleiner als die der unteren (hinteren), sonst aber ihnen völlig gleichgestaltet.

Die Anatomie der Blätter weist nur geringe Unterschiede bei den verschiedenen Arten auf. Wie die Achse, so zeigen auch die Blätter eine dickwandige Epidermis mit starker Cuticula. Im Innern befindet sich ein recht einfach gebautes Leitbündel. Um dieses herum sowie unterhalb der Epidermis liegen wie bei der Achse oft sklerenchymatische Elemente, die wohl wie bei der Achse als mechanischer Ring gedeutet werden können. Charakteristisch für erwachsene Blätter der Geophyten ist ein unregelmäßiger Längsspalt im Assimilationsgewebe (Fig. 4).

Die Farbe der Achse wie der Blätter kann, da sie oft konstant ist, als Artmerkmal in Gemeinschaft mit anderen Kennzeichen gelten. *L. miniatum* (Sect. I) besitzt stets eine rote Achse. Aus der Sect. II zeichnen sich *L. rubrum*, *rufescens*, *erythraeum*, *saururus* var. *Hieronymi* durch rote Färbung der Achse wie der Blattspitzen aus. Hellgrün gefärbt sind die zartblättrigen (*L. tenuifolium*, *verticillatum*) oder die mit fein gezähntem Rande versehenen Arten (*L. dentatum*), ferner *L. saururus* und einige Arten aus den Sektionen der Epiphyten. Dunkelgrün, gelb oder braun erscheinen viele gleichzeitig mit glänzenden Blättern versehene Spezies (*L. lucidulum*, *Hamiltonii*, *cryptomerinum*, die Arten der Gruppe *Hartwegianum*, sowie viele Arten der Sektionen VI u. VII).

Neben der oben geschilderten (bipartiten) Verzweigung kommt nicht selten, worauf weiter unten näher eingegangen wird, Bildung von Adventivsprossen vor. Es können an beliebiger Stelle der Achse entweder nur Wurzeln oder Wurzeln und Stammteile oder nur Stammteile entstehen. Einen Spezialfall stellen die Adventivknospen dar. Diese, gewöhnlich Brutknospen oder Bulbillen genannt, kommen fast ausschließlich bei den Geophyten vor. Am häufigsten finden sie sich bei den borealen Arten der Gruppe *Selago* (*L. sinense*, *tenuifolium*, *Delavayi*, *selago*, *suberectum*, *porophilum*, *lucidulum*), doch fehlen sie auch bei tropischen Arten nicht (*L. miniatum*, *ceylanicum*, *serratum*). Seltener sind sie in anderen Sektionen beobachtet worden. Ich komme auf diesen Punkt im ökologischen Teil zurück.

Anhangsweise möchte ich erwähnen, daß hier der sonst so vorzügliche Beobachter PRITZEL in Engl. Pflanzenfam. I, 4 1900 ein Opfer der konfusen Angaben in der Literatur geworden ist. Er unterscheidet Pseudoadventivknospen und Brutknospen. Erstere sollen bei *L. inundatum*, aber auch bei *L. reflexum*, *verticillatum*, *taxifolium* (= *struthioloides*?) usw., letztere bei *L. selago*, wieder *reflexum*, *lucidulum*, *miniatum*, *serratum* vorkommen. Meines Erachtens ist zwischen diesen beiden »Formen der Ableger« kein Unterschied vorhanden¹⁾.

Wie bereits erwähnt, sind im Gegensatz zu den Rhopalostachyen bei

1) Auch VELENOVSKÝ l. c. p. 244, 257—259 scheint keinen Unterschied gefunden zu haben.

Urostachys die Sporophyllstände oft gegabelt und ebenso breit (*Euselago*) oder schmaler (Sect. *Carinaturus* und *Phlegmariurus*) als die vegetativen Teile, nie breiter. Dementsprechend sind auch die Sporophylle höchstens so groß (*Euselago*) oder kleiner (*Carinaturus*, *Phlegmariurus*) als die vegetativen Blätter. Sie gehen in diese allmählich über (*Carinaturus*) oder nicht (*Phlegmariurus*). Diese Verhältnisse sind als Haupteinteilungsprinzipien der *Urostachya* von großer Wichtigkeit. Zur Arttrennung kommen Sporophyllstände und Sporophylle nur selten in Betracht. Noch unwesentlicher für die Systematik sind Sporangien und Sporen. Erstere finden sich stets auf den Sporophyllen in der Nähe der Anheftungsstelle derselben, haben $\pm$ nierenförmige Gestalt und schwefelgelbe bis braune Farbe. Die Größe beträgt durchschnittlich $4 \times 1,25$ mm. Die Sporen besitzen netzartige Verdickungen, die bei den einzelnen Arten nur sehr geringe Verschiedenheiten zeigen.

IV. Ökologische Bemerkungen.

Unter den Lycopodien der Untergattung *Urostachys* gibt es weder Hydrophyten, noch Xerophyten, noch Halophyten im Sinne WARMINGS (Lehrb. d. ökolog. Pflanzengeographie. Deutsche Ausg. Berlin 1896). Sämtliche Arten wären also als Mesophyten zu bezeichnen.

Der Boden, den die Urostachyen bewohnen, ist wohl stets Humuserde, die nicht zu naß (etwa 80% Wassergehalt) und nicht zu trocken (etwa 20% Wassergehalt) sein darf. Salz- und Salpeterboden wird gemieden, auch auf stark kalkhaltigem Boden finden sich keine Arten. Bei reichlicher Luftfeuchtigkeit und Wärme, also in den Tropen, leben die Urostachyen epiphytisch in Felsspalten oder zwischen Rinde und Moos auf Baumstämmen, doch nur, wenn eine genügende Menge Humus vorhanden ist. Geophytische Arten treten an solchen Stellen zurück. Ihr regulär-bipartites Verzweigungssystem gestattet ihnen nicht, wie das die Lycopodien anderer Untergattungen vermögen, im Gesträuch hochzuklettern oder gerade aufrecht wachsend schnell eine bedeutende Höhe zu erreichen wie viele ihrer Konkurrenten am Boden der Regenwälder. So können sich hier die geophytischen Arten nur an offenen Plätzen, an Flußrändern, Büschungen usw. erhalten.

Von Standorten kommen etwa folgende in Betracht:

A. Gebüschvereine.

Mesophile Gebüsch auf Mooren, Heiden, Geröllhalden und Felsfluren.

4. In arktischen und subarktischen Gebieten in der Ebene, in gemäßigten Gebieten in Gebirgen und Hochgebirgen. — Hier wohnen nur wenige Geophyten.

2. In subtropischen und tropischen Gebieten besonders im Hochgebirge, so auf den Punas und Páramos in der subandinen Provinz Südamerikas¹⁾. — Hierher gehört die Mehrzahl der Geophyten.

B. Waldvereine.

1. Nadelwälder¹⁾. — Hier wenige Geophyten.

2. Laubwälder gemäßigter und subtropischer Gebiete. — Hier nur wenige Geophyten.

3. Tropische Regenwälder. — Hierher gehört die Mehrzahl aller Arten, wenige Geophyten und alle Epiphyten.

Die *Urostachys*-Arten bevorzugen entschieden gebirgige Gegenden. Die Meereshöhe, in welcher sie am häufigsten vorkommen, richtet sich nach der geographischen Breite der Lokalität. So sind verwandte Arten der Gruppe *Selago*, die in Spitzbergen in wenigen Metern über dem Meere zu finden sind, in den Alpen in 2500 m und in den Anden in 5000 m Höhe verbreitet. Selbst die Epiphyten, die ausschließlich tropische Gebiete bewohnen, zeigen eine besondere Vorliebe für die Gebirgs- und Hochgebirgszonen. Folgendes Schema soll die Häufigkeit der *Urostachya* in den verschiedenen Gebieten in verschiedenen Meereshöhen darstellen.

Meereshöhe	1. Arktische Gebiete	2. Subarktische Gebiete	3. Gemäßigte Gebiete	4. Subtropische Gebiete	5. Tropische Gebiete
0 m	+	++	+++	++	+
4000 m		+	++	+++	++
2500 m			+	++	+++
5000 m				+	+

In xerophilen Gebieten, die man als 6. Gebiet anschließen könnte, würden in der ersten Höhenzone *Urostachya* völlig fehlen, das Maximum würde in die letzte Zone rücken.

Keine Art ist als häufig zu bezeichnen. Selbst die relativ häufigsten Arten der tropischen Gebirge trifft man stets nur an wenigen Stellen an, allerdings dort meist gesellig.

Als Begleitpflanzen der *Urostachys*-Arten treten stets andere Pteridophyten und Bryophyten (oft *Sphagnum*) auf.

Das Wachstum geht sehr langsam vor sich. Die trockenheitliebenden Geophyten wachsen jedes Jahr nur um einige Millimeter in die Länge, die Epiphyten der Regenwälder wohl mitunter um Bruchteile eines Meters. Dementsprechend ist ihr Alter oft ein recht hohes, vielleicht sogar unbegrenztes, wie bei den *Rhopalostachys*-Arten; aus Altersschwäche gestorbene Lycopodien sind, soviel ich weiß, noch nicht gefunden worden.

1) Von WARMING l. c. zu den Xerophytenvereinen gestellt.

Die Vermehrung erfolgt in der Regel durch die Sporen. Diese werden wegen ihrer großen Leichtigkeit durch den Wind weithin verbreitet, doch erstreckt sich diese Ausbreitung wohl kaum über die Ozeane hinweg.

Wichtiger ist wohl die ungeschlechtliche Vermehrung durch vegetative Knospung. Nach TREUB vermehren sich selbst die Prothallien tropischer Arten, so die von *L. phlegmaria* und Verwandten, außerordentlich stark vegetativ und nehmen seiner Ansicht nach nur selten aus Sporen ihren Ursprung. Der Sporophyt vermag an jeder beliebigen Stelle eine neue Pflanze hervorzubringen. Bei den epiphytischen Arten der Sect. *Phlegmariurus* beobachtet man selbst an den reproduktiven Teilen an Stellen, die etwa dem moosbedeckten Baumstamm genähert sind, Bildung von Wurzeln und nach der entgegengesetzten Seite von Stammteilen. Bei den Geophyten treten an Stellen, die durch Laub usw. bedeckt werden, Adventivwurzeln auf. Es sterben dann die am tiefsten im Boden befindlichen, ältesten Teile ab, und im Laufe der Jahrzehnte sind aus einem Individuum eine große Anzahl von Tochterindividuen entstanden, die in konzentrischem Kreise um die Stelle weiterwachsen, an welcher die Mutterpflanze gestanden hat. Die Rhizome der Tochterindividuen weisen sämtlich nach diesem Punkte hin. Diese Art der Vermehrung, die ich bei *L. selago* und *L. saururus* beobachtete, erinnert bereits an die der kriechenden Lycopodien, bei denen das hintere Ende stets in dem Maße abstirbt, als das vordere weiterkriecht, die also als »unsterblich« bezeichnet werden könnten. Sie geht aber bei *Urostachys* viel langsamer vor sich und tritt gegenüber den anderen Fortpflanzungsmöglichkeiten zurück.

Aus dieser Fähigkeit der Urostachyen, an beliebigen Stellen Adventivsprosse zu bilden, kann man eine eigentümliche Art der vegetativen Vermehrung ableiten, nämlich die Bildung von Brutknospen oder Bulbillen. Die Arten, bei denen Brutknospen auftreten, wurden bereits p. 22 aufgezählt. Es sind dies fast ausschließlich Geophyten und zwar meist Arten borealer Gebiete oder alpiner Zonen. Vielleicht hängt es mit den klimatischen Bedingungen des Wohnorts zusammen, daß gerade bei diesen Arten die Bulbillenbildung so regelmäßig eintritt und die übrigen Möglichkeiten der Fortpflanzung zur Ausnahme geworden sind.

Obgleich unsere Kenntnis von der Abhängigkeit der Organismen von äußeren Umständen noch nicht weit vorgeschritten ist, läßt sich wohl doch noch eine Reihe von Merkmalen der *Urostachys*-Arten zu den klimatischen Faktoren ihres Standortes in Beziehung bringen.

Die edaphischen Faktoren SCHIMPER, Pflanzengeographie, Jena 1898 haben bereits oben Berücksichtigung gefunden. Die vier klimatischen Faktoren Feuchtigkeit, Beleuchtung, Temperatur und Wind wirken in gleichem Sinne auf unsere Pflanzen, so daß sich zwei Gruppen unter-

scheiden lassen, die der Kürze halber isophile und tropophile¹⁾ Arten heißen mögen.

Die isophilen Arten oder Isophyten lieben gleichmäßige Wasserzufuhr, gleichmäßiges Licht, gleichmäßige Wärme und gleichmäßig bewegte Luft, während die tropophilen Arten oder Tropophyten in Klimaten gedeihen, in denen sie großen Unregelmäßigkeiten in bezug auf Feuchtigkeit, Beleuchtung, Temperatur und Wind ausgesetzt sind.

Die typisch isophilen Urostachyen besitzen schlanke, zart gebaute,



Fig. 3. Stammquerschnitte von *L. selago* (a) und *phlegmaria* (b) als Beispiele für einen tropophilen Geophyten und einen isophilen Epiphyten. Vergr. 60.

meist schlaff herabhängende, reich gegabelte Achsen und spärliche, die Achse nicht bedeckende, wagerecht abstehende, große, breite, dünne, glanzlose, dorsiventrale, flache, unbewimperte, höchstens grob gezähnte (*L. serratum*) Blätter. Anatomisch zeigen Achse wie Blätter der Isophyten nur wenige Festigungselemente (Fig. 4). Hierher gehören fast alle Epiphyten

1) SCHIMPER l. c. faßt die Bezeichnung Tropophyten im Sinne von Mesophyten.

und wenige Geophyten. Besonders ausgeprägt isophile Struktur zeigt von ersteren *L. linifolium*, von letzteren *L. serratum*.

Die tropophilen Arten dagegen sind aufrecht, besitzen gedrungenen, oft zwerghaften Wuchs und fleischigen, kompakten Bau. Die Blätter stehen steil auf- oder abwärts, dicht, bedecken die Achse, haben dicke, holzige Textur, kleine, oft schuppige oder nadelartige, selbst isolaterale Gestalt, ihre Ränder sind oft umgerollt oder bewimpert. Anatomisch zeigen sowohl Achse wie Blatt unterhalb der Epidermis wie um den Gefäßstrang mehrere Schichten sklerenchymatischer Gewebe (Fig. 3 und 4). Alle diese Eigen-




Fig. 4. Blattquerschnitte von *L. tenuifolium* (a, isophyller Geophyt), *saururus* (b, tropophyller Geophyt), und *nummulariifolium* (c, isophyller Epiphyt). i Innenseite, e Außenseite. Vergr. 60.

schaften dürfen wohl als Anpassungen an zeitweise Trockenheit, starke Beleuchtung (Blattstellung), hohe Wärme- oder Kältegrade sowie gegen durch Wind etwa ausgeübten Zug oder Druck (mechanisches System) aufgefaßt werden. In der Tat zeigen tropophile Charaktere besonders Geophyten, so die andinen Arten der Sekt. *Crassistachys*. Man würde diese Pflanzen

dem Habitus nach ohne weiteres für extreme Xerophyten halten. Auch die polaren Formen von *L. selago* gehören hierher, während die Formen der gemäßigten Gebiete eine Mittelstellung einnehmen.

Wie *L. selago*, so kann man auch andere Arten je nach dem Standort als isophil oder tropophil bezeichnen. Selbst an demselben Individuum zeigen oft die unteren Blätter isophile, die oberen tropophile Stellung.

Die rote Färbung einiger tropophiler Arten ist vielleicht ebenfalls als Schutzmittel zu betrachten. GOEBEL, Organographie, Jena 1898—1900, schreibt auch die Anisophyllie (bilaterale Blattstellung) dem Einfluß der Beleuchtung zu. Er konnte bei dem gewöhnlich isophyllen *L. alpinum* experimentell Anisophyllie hervorrufen. In der Untergattung *Urostachys* kommt, wie bereits erwähnt, Anisophyllie nur bei einer Art, *L. phlegmarioides*, vor.

Merkwürdig und noch der Aufklärung bedürftig ist das regelmäßige Vorkommen einer Höhlung im Innern der Blätter vieler Geophyten. Ich beobachtete diese Erscheinung bei *L. selago* und *L. saururus* auch in frischem Zustande (Fig. 4).

V. Geographische Verbreitung.

Weitaus die Mehrzahl der Arten des Subgenus *Urostachys* ist in den tropischen Gebieten verbreitet. Das boreale Florenreich enthält nur 8 Arten, von denen eine, *L. selago*, bis in die Arktis vordringt. In ganz Europa findet sich nur diese eine Art. Vollständig fehlt *Urostachys* im äußersten Norden der Kontinente, im nordafrikanisch-indischen Wüstengebiet, im mexikanischen Xerophytengebiet, im antarktischen Südamerika und im Innern Australiens. Verhältnismäßig wenige Vertreter finden sich in Afrika und wie im borealen so auch im australen Florenreich. Die der Antarktis benachbarten Gebiete Südamerikas, die Kerguelen und Tristan da Cunha bewohnt wieder nur je eine Art aus der näheren Verwandtschaft des *L. saururus*. Auf den Falklands-Inseln fand sich eine Varietät von *L. selago*.

Die Hauptverbreitungszentren unserer Untergattung sind das Gebiet des tropischen Amerika und das Monsungebiet. Ersteres enthält 78 Arten, unter denen 75 endemisch sind, letzteres im ENGLERSchen Sinne¹⁾ 26 Arten mit 15 Endemismen.

Die Verteilung der Arten innerhalb der Sektionen, wie sie auf den Karten 2—4 dargestellt ist, läßt sich kurz folgendermaßen schildern.

Die ersten beiden Sektionen, welche die Subtribus *Geophytia* bilden, besitzen die weiteste geographische Verbreitung.

Sect. I. *Selaginurus* enthält die am weitesten polwärts, im Norden

1) Das paläomalesische Gebiet Monsungebiet im weiteren Sinne bewohnen 39 Arten, davon 33 endemisch.

bis Spitzbergen, im Süden bis zu den Falklandinseln verbreitete Art. *L. selago*. Die Art meidet die tropischen und subtropischen Gebiete, doch ist sie in diesen durch nahe Verwandte vertreten. Die südamerikanischen Arten *L. cruentum*, *saururoides*, *Christii*, stehen Arten der Sect. II sehr nahe. Eine natürliche Gruppe bilden die Verwandten des *L. serratum* im paläotropisch-austral Florenreich mit einem merkwürdigen Vorkommnis in Mexiko. Ganz isoliert stehen die Arten Madagaskars: *L. Hildebrandtii*, *pecten* und *xiphophyllum* sowie auch *L. Hamiltonii* im Himalaya und *L. cryptomerinum* in Japan.

Sect. II. *Crassistachys*, die artenreichste aller Sektionen, stellt einen recht natürlichen Verwandtschaftskreis dar, wenn man von der Gruppe *Reflexa* absieht, die den Übergang zu den Sektionen I und III vermittelt. Die übrigen Arten gruppieren sich um *L. saururus*, das völlig typisch außer in Südamerika noch in Afrika und in etwas abweichenden Formen auf St. Helena, Tristan da Cunha und den Kerguelen vorkommt. Alle übrigen Arten gehören ausschließlich dem zentral- und südamerikanischen Florenreich an. Hier bewohnt die Mehrzahl die subäquatoriale andine Provinz, wenige Arten, besonders aus der Gruppe *Reflexa*, finden sich auf den Antillen und in Brasilien. Der größte Geophyt, *L. trencilla*, von den Anden Ecuadors, gehört in diese Sektion, Gruppe *Rufescentia*.

Die übrigen 3 Sektionen enthalten tropische und subtropische Epiphyten, im ganzen etwa eben so viele Arten wie Sect. I und II zusammen. Von weit verbreiteten Arten sind hier *L. verticillatum*, *L. phlegmaria*, *L. squarrosum* zu nennen. Während Sect. I vorwiegend altweltliche, Sect. II fast ausschließlich neuweltliche Arten enthält, lassen sich hier in den Sektionen häufig Parallelreihen im paläotropisch-austral und im zentral- und südamerikanischen Florenreich erkennen. Es tritt dies noch deutlicher hervor, wenn man die Sektionen V und VI, die sehr nahe verwandte Arten enthalten, zusammenfaßt.

So verteilen sich die *Urostachys*-Gruppen folgendermaßen auf die Hauptflorenreiche (cf. umstehende Tabelle).

Die Verbreitung der einzelnen Arten in den von ENGLER (Syllabus der Pflanzenfamilien, 5. Aufl., Berlin 1907) unterschiedenen Florengebieten gestaltet sich folgendermaßen.

Das boreale Florenreich enthält nur 8 Arten, von denen 7 endemisch sind, alle 8 aus der Sect. I *Selaginurus*. Im arktischen Gebiet ist *L. selago**¹ auf Südspitzbergen, Westgrönland bis 70° n. Br. und auf den Aleuten in einer arktischen Form verbreitet. Von der Bäreninsel, Nowaja Semlja und Jan Mayen ist es bisher nicht bekannt geworden. Die Provinzen des subarktischen Eurasien enthalten ebenfalls nur diese Art, dagegen tritt im subarktischen Amerika neben *selago lucidulum** als

1) An der Stelle, an welcher eine Art zuerst genannt wird, ist sie mit * versehen.

gut charakterisierte Spezies auf. Im mitteleuropäischen Gebiet ist *selago* als einzige Art weit verbreitet, im Mediterran- und zentralasiatischen Gebiet nur auf den Hochgebirgen. Das makaronesische Gebiet besitzt 2 Arten: *suberectum** auf Madeira und *dentatum** auf den Azoren, von denen die erstere auch auf Réunion vorkommt. Im tempe-

Sektion	Gruppe	Paläotropisches und australes Florenreich	Zentral- u. südamerikan. Florenreich
I. <i>Selaginurus</i>	<i>Selagina</i>	+	+
	<i>Serrata</i>	+	.
	<i>Everettia</i>	+	.
	<i>Pectenia</i>	+	.
	<i>Hamiltonia</i>	+	.
II. <i>Crassistachys</i>	<i>Saurura</i>	+	+
	<i>Brongniartia</i>	.	+
	<i>Affinia</i>	.	+
	<i>Rufescentia</i>	.	+
	<i>Reflexa</i>	.	+
III. <i>Tenuistachys</i>	<i>Intermedia</i>	.	+
	<i>Zollingeria</i>	+	.
	<i>Verticillata</i>	+	+
	<i>Tetragona</i>	.	+
	<i>Funiformia</i>	+	+
IV. <i>Dichotomurus</i>	<i>Setacea</i>	+	.
	<i>Dichotoma</i>	.	+
V. <i>Linifoliurus</i>	<i>Linifolia</i>	.	+
VI. <i>Carinaturus</i>	<i>Carinata</i>	+	.
	<i>Gnidioidea</i>	+	.
	<i>Varia</i>	+	.
	<i>Poissonia</i>	+	.
VII. <i>Phlegmariurus</i>	<i>Squarrosa</i>	+	.
	<i>Nutantia</i>	+	.
	<i>Euphlegmaria</i>	+	.
	<i>Myrsinitia</i>	.	+
	<i>Aqualupiana</i>	+	+
	<i>Nummulariifolia</i>	+	.

rierten Ostasien treten neben dem dort seltenen *selago* 3 weitere Arten auf: *sinense** und *Delavayi** in China, *tenuifolium** in Japan. Im pazifischen Nordamerika finden sich *selago* und *lucidulum*, vornehmlich auf den Gebirgen, im inneren atlantischen Nordamerika wurde außerdem eine neue Art, *porophilum*,* bekannt.

Im paläotropischen Florenreich kommen 45 Arten vor, davon 40 endemisch. 7 Arten mit 2 endemischen finden sich in den afrikanischen

Gebieten, 8 mit 5 endemischen auf Madagaskar, 6 mit 4 endemischen im vorderindischen Gebiet, 26 mit 2 endemischen im Monsungebiet, 7 mit 6 endemischen im ostchinesisch-süd-japanischen Übergangsgebiet und 6 Arten mit 4 Endemismen auf Hawaii.

Aus dem nordafrikanisch-indischen Wüstengebiet ist keine Spezies bekannt geworden. Das afrikanische Wald- und Steppengebiet enthält nur 5 Arten, wovon nur 1 endemisch; und zwar: aus der großen sonst fast ausschließlich südamerikanischen Sect. *Crassistachys* (Subtribus *Geophyta*) *saururus**, aus der Subtribus *Epiphyta* die Arten *verticillatum**, *guidioides**, *dacrydioides**, *phlegmaria**. Von diesen ist *saururus* nur noch auf den mikromalagassischen Inseln, jedoch in nahe verwandten Formen auch auf Tristan da Cunha, St. Helena, den Kerguelen und in Südamerika verbreitet; *verticillatum* ist zirkumtropisch, fehlt jedoch ebenfalls in Madagaskar, *guidioides* findet sich auch im Kapland sowie im mikro- und makromalagassischen Gebiet; *dacrydioides* ist endemisch; *phlegmaria* ist im ganzen paläotropischen und australen Florenreich verbreitet. Die Insel S. Thomé wird von denselben Arten bewohnt, nur *dacrydioides* scheint dort zu fehlen. Im Kapland kommt eine weitere Art, *squarrosum**, vor. Diese bewohnt außerdem das malagassische Gebiet, Ceylon und das Monsungebiet. Im Gebiet der südatlantischen Inseln treten 2 endemische Geophyten auf, von denen der eine, *saururoides** auf Ascension, zur Sect. I, der andere, *axillare**, auf St. Helena, zur Sect. II gehört.

Auf den mikromalagassischen Inseln fand sich neben *lucidulum* und den Arten des afrikanischen Festlandes mit Ausnahme von *dacrydioides* nur eine (endemische) Art, deren Verwandte im zentral- und südamerikanischen Florenreich sowie im Monsungebiet verbreitet sind. Es ist dies *ophioglossoides**. Insgesamt wurde bekannt:

Von Mauritius und Réunion: *lucidulum*, *saururus*, *verticillatum*, *guidioides*, *squarrosum*, *phlegmaria*, *ophioglossoides*.

Von den Comoren: *lucidulum*, *saururus*, *verticillatum*, *guidioides*, *phlegmaria*, *ophioglossoides*.

Von den Seychellen: *saururus* und *phlegmaria*.

Das makromalagassische Gebiet oder Madagaskar besitzt dagegen 5 endemische und nur 3 mit Afrika gemeinsame Arten: Von Geophyten aus der Sect. *Selaginurus* die endemischen *Hildebrandtii**, *pecten**, *xiphophyllum**, von Epiphyten aus der Sect. *Carinaturus*: *guidioides* und die Endemismen *strictum** und *pachyphyllum**; ferner aus der Sect. *Phlegmariurus*: *squarrosum* (Afr., Mons.) und *phlegmaria*.

Aus dem Tiefland des vorderindischen Gebietes sind keine Lycopodien bekannt geworden. Dagegen kommt in den Nilgiri-Hills der Geophyt *serratum** (Indomalesien, Mexiko) und der Epiphyt *phyllanthum** Mons. vor. — In Ceylon finden sich 6 Arten. 2 Geophyten: *ceylanicum** endemisch, und *serratum* Indomales., Mex. und 4 Epiphyten: *slaccum**

(Indomales.), *proliferum** (Java), *squarrosus* (Afr., Indomales.), *phyllanthum* (Mons.).

Das Monsungebiet (im ENGLERSchen Sinne) besitzt nächst dem Gebiet des tropischen Südamerika die größte Artenzahl, nämlich 26 Arten mit 45 Endemismen.

Im tropischen Himalaya (Kumaon, Nepal, Sikkim, Bhutan, Assam) gedeihen 3 endemische und 2 weiter verbreitete Geophyten: *sikkimense**, *vernicosum**, *Hamiltonii**, *serratum* (Indomales., Mex.), *petiolatum**, sowie 3 Epiphyten: *verticillatum* (Afr., Mons., Neotrop.), *setaceum* (Indomales.).

Aus den malayischen Provinzen wurde bekannt:

Hinterindien (Tonkin, Siam, Malaga): *serratum* (Indomales., Mex.), *carinatum** (Mons.), *Dalhousieanum** (Mons.).

Sumatra: *australianum** (Mons., Austral.), *serratum* (Indomales., Mex.).

Java: *australianum* (Mons., Austral.), *serratum* (Indomales., Mex.), *proliferum* (Ceylon), *verticillatum* (Afr., Mons., Neotrop.), *setaceum* (Indomales.), *carinatum* (Mons.), *squarrosus* (Afr., Indomales.), *phyllanthum* (Indomales.), *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.), und 3 Endemismen: *miniatum**, *Zollingerii**, *pinifolium**.

Borneo: *australianum* (Mons., Austral.), *serratum* (Indomales., Mex.), *verticillatum* (Afr., Mons., Neotrop.), *Dalhousieanum* (Mons.).

Celebes: *australianum* (Mons., Austral.), *serratum* (Indomales., Mex.), *verticillatum* (Afr., Mons., Neotrop.) und 4 endemische Art *Everettii**.

Von den Molukken und von Timor sah ich keine *Urostachya*.

Aus der papuanischen Provinz wurden gesammelt: Neu-Guinea: *carinatum* (Mons.), *Dalhousieanum* (Mons.). Bismarckarchipel: *varium** (sonst nur Austral.). Sta. Cruz-Insel Vanicoro: *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.), *phlegmarioides** (Mons.).

In der Araucarienprovinz fanden sich: auf Neu-Kaledonien: *serratum* (Indomales., Mex.), *nutans** (endem.), *Balansae** (endem.).

In der Provinz der Philippinen: *carinatum* (Mons.), *squarrosus* (Afr., Indomales.), *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.).

In der Melanesischen Provinz: Auf den Neuen Hebriden: *serratum* (Indomales., Mex.), *phyllanthum* (Indomales.), *oceanianum** (endem.). Auf den Fidschi-Inseln: *serratum* (Indomales., Mex.), *pseudophlegmaria** (endem.), *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.). Auf den Samoa-Inseln: *serratum* (Indomales., Mex.), *squarrosus* (Afr., Mons.), *phyllanthum* (Indomales.), *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.). Auf den Marianen kommt *phlegmarioides* (Mons.) und *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.) vor. Auf Tahiti schließlich wurde *varium* (Mons., Austral.), *squarrosus* (Afr., Indomales.), *phlegmaria* (Afr., Mons., Austral.) und die endemischen Arten *Haeckelii** und *Ribourtii**, auf der Gesellschaftsinsel Borabora nur *phlegmaria* gesammelt.

Im ostchinesisch-süd-japanischen Übergangsgebiet kommt

eine Reihe von Geophyten vor. In China die endemischen Arten *sutchuenianum**, *Fargesii**, in Japan die Endemismen *cryptomerinum**, *Poissonii**, *Sieboldii**, außerdem *serratum* (Indomales., Mex.) und *petiolatum** im ganzen Gebiet.

Das Gebiet der Sandwich-Inseln (Hawaii) bewohnen von Geophyten: *serratum* (Indomales. Mex.) und 4 endemische Arten: *Haleakalae**, *Hellerii**, *sulcinervium**, *erubescens**; von Epiphyten wurde nur *phyllanthum* (Indomales.) bekannt.

So kommen im indomalesischen Gebiet (Monsungebiet im weiteren Sinne) 39 Arten vor: von Geophyten (nur Sect. *Selagina*) 17. davon 15 endemisch:

Haleakalae, *minutum*, *australianum* (auch Austral.), *sikkimense*, *ceylanicum*. *Hellerii*, *sutchuenianum*, *sulcinervium*, *serratum* (auch Mexiko), *vernicosum*, *erubescens*, *Everettii*, *Zollingerii*, *Hamiltonii*, *cryptomerinum*, *Poissonii*, *petiolatum*.

Von Epiphyten finden sich 22 Arten mit 18 Endemismen:

verticillatum (auch Afr., Z.- u. S.-Amer.), *Haeckelii*, *Sieboldii*, *setaceum*, *proliferum*, *molongense*, *Dalhousieanum*, *carinatum*, *varium* (auch Austral.), *squarrosus* (auch Afr.), *oceanianum*, *pseudophlegmaria*, *flagellaceum*, *Hellwigii*, *phlegmarioides*, *Ribourtii*, *nummulariifolium*.

Am reichsten an *Urostachys*-Arten ist das **zentral- und südamerikanische Florenreich** mit 78 Arten, worunter 75 Endemismen. Hier gelangen in den tropischen Regenwäldern die Epiphyten in der gleichen Weise zur Ausbildung wie im Monsungebiet. Es ist zwar nur ein Epiphyt, *verticillatum*, beiden Florenreichen gemeinsam, doch wird, wie oben p. 21 angedeutet, fast jede Gruppe der alten Welt durch nahe verwandte Arten in der neuen Welt vertreten. Die Geophyten der neuen Welt sind sehr eigenartig ausgebildet. Die Cordillere hat hier eine außerordentlich große Anzahl von Arten hervorgebracht, die sich meist durch stark xerophilen (richtiger »tropophilen«, cf. p. 18 u. 19) Bau vor allen übrigen Arten auszeichnen.

Im eigentlichen mittelamerikanischen Xerophytengebiet fehlen *Urostachya*. In der Provinz des tropischen Zentralamerika kommen vor: Aus Sect. I ganz vereinzelt, aber sicher verbürgt, *serratum* (Indomales.) in Mexiko. Am weitesten nördlich geht eine Art aus Sect. II, die in sehr vielen Formen auch auf den Antillen und auf dem südamerikanischen Festlande bis Südbrasilien verbreitet ist, *reflexum**. Aus den übrigen Sektionen (Epiphyta) finden sich hier *verticillatum* (paläo- und neotrop.), *tenue** (andin.), *polytrichoides** (endem.), *tetragonum** (andin.), *mexicanum* (Mex. — Guiana), *gigas** (— Cuba), *linifolium** (neotrop.), *Schwendnerii** (Mex., Venezuela), *myrsinites** (neotrop.).

Aus der westindischen Provinz wurden bekannt:

a) Von den Großen Antillen: Sect. II: *reflexum* (Mex. — Bras.), Sect. III — VII: *verticillatum* (paläo- und neotrop.), *funiforme** (nördl. Neotrop.), *mexicanum* (Mex. — Guiana), *dichotomum** (and.), *gigas* (Mex.), *linifolium**

(neotrop.), *struthioloides** (and.), *Schwendnerii* (Mex. — Venez.), *cubanum** (Cuba), *myrsinites* (neotrop.).

b) Von den Kleinen Antillen: Sect. II: *reflexum* (Mex. — Bras.), *Sieberianum** (endem.), Sect. III—VII: *verticillatum* (paläo- und neotrop.), *funiforme* (nördl. Neotrop.), *chamaepeuce** (auch Guiana), *trichodendron** (endem.), *linifolium* (neotrop.), *Schwendnerii* (and.), *aqualupianum** (— Guian.).

In der cisäquatorialen Savannenprovinz (Guiana, Trinidad, Teile von Venezuela) kommen vor: Sect. II: *reflexum* (Mex. — Bras.), *brutum** (endem.), Sect. III—VII: *funiforme* (nördl. Neotrop.), *chamaepeuce* (auch Guadeloupe), *mexicanum* (nördl. Neotrop.), *linifolium* (neotrop.), *Schwendnerii* (Mex. — Venez.), *myrsinites* (neotrop.), *aqualupianum* (Kl. Antill.).

In den brasilianischen Florenprovinzen (Hylaea - - Peru; Südbrasilien: Nordargentinien; Paraguay) gedeihen: die Geophyten *Christii** (endem.), *rubrum** (endem.), *Martii** (endem.), *diminuens** (endem.), *attenuatum** (and.), *parrifolium** (endem.), *brasilianum** (endem.), *andinum** (and.), *reflexum* (— Mexiko), *Sellowianum** (endem.) und die Epiphyten: *verticillatum* (paläo- und neotrop.), *fontinaloides** (endem.), *quadrifarium** (endem.), *flaccidum** (endem.), *pseudomandiocanum** (endem.), *heterocarpum** (endem.), *linifolium* (neotrop.), *pruinatum** (endem.), *myrsinites* (neotrop.), *Aschersonii** (endem.).

Weitaus die meisten *Urostachya* beherbergt die subäquatoriale andine Provinz. Bisher wurden hier 49 Arten gesammelt, worunter 44 Endemismen darstellen. Größere Verbreitung besitzen nur die Geophyten *saururus* (— S.-Afr.), *reflexum* (Mex. — Brasil.), *tenue* (neotrop.), *tetragonum* (Zentralamerika) und die Epiphyten *dichotomum* (Große Antill.), *linifolium* (neotrop.), *struthioloides* (Antill.), *myrsinites* (neotrop.). Alle übrigen (44) Arten sind endemisch: Sect. I: *cruentum**, *barbatum**, Sect. II: *polycladum**, *erythraeum**, *venezuelanicum**, *Pearcei**, *Williamsii**, *crassum**, *Lechlerii**, *Funckii**, *Schlimii**, *Weddellii**, *Hartwegianum**, *Brongniartii**, *Englerii**, *affine**, *Jamesonii**, *Tobari**, *ocananum**, *attenuatum**, *rufescens**, *Schmidtchenii**, *Rimbachii**, *lignosum**, *serpentineformis**, *nanum**, *Hohenackerii**, *Goudotii**, *trencilla**, *Urbanii**, *firmum**, *binervium**, *ecuadoricum**. Sect. III—VII nur *tetragonum**, *andinum**, *sarmentosum**, *Lindenii**, *echinatum**, *meridense**, *durissimum**, *Stuebelii**, *cuneifolium**, *callitrichifolium**.

In den hochandinen sowie argentinisch-chilenischen Provinzen (extratropisches andines Gebiet) ist nur *L. saururus* (And.-S.-Afr.) vorhanden. Dieselbe Art bewohnt auch Juan Fernandez. Von den Galapagos-Inseln und von Mas-a-fuera ist sie nicht bekannt geworden.

Im australen Florenreich schließlich kommen 8 Arten vor, von denen 6 Endemismen sind.

Im Gebiet des austral-antarktischen Südamerika fehlen *Urostachya*.

Das Gebiet der Kerguelen beherbergt eine endemische Art aus der näheren Verwandtschaft des *saururus* (Afr.-And.): *breve**.

In Neuseeland fand sich bis jetzt nur 1 Geophyt: *australianum* (auch Mons.) und 2 Epiphyten: *Billardieri** (endem.) und *varium* (auch Mons.).

Auf den Campbell- und Auckland-Inseln kommt ebenfalls *varium* vor.

Aus Australien (Gebirge des Ostens) wurden bekannt: ebenfalls *varium* und der endemische Epiphyt *molongense**.

Auf Tasmania wohnt wieder *australianum* und *varium*.

Auf den Falkland-Inseln wurde *selago* var. *Aschersonii** (endem.) gefunden.

Eine andere Varietät von *selago*, var. *Hessei**, bewohnt Tristan d'Acunha. Daneben findet sich auf dieser Insel ebenfalls endemisch eine Art aus der näheren Verwandtschaft des *saururus* (Afr.-And.): *insulare**.

In der folgenden Tabelle ist die Artenzahl jeder Sektion in den Florengebieten übersichtlich zusammengestellt.

Man kann nun die *Urostachya* nach der Größe des von ihnen bewohnten Areals folgendermaßen gruppieren:

A. Über die alte und neue Welt verbreitete Arten: 4:

Südafrika, Sundainseln, tropisches Zentral- und Südamerika: *verticillatum*.

Boreales Florenreich: *selago*.

Südafrika, südliches Südamerika: *saururus*.

Sacchalin — Monsungebiet, Mexiko: *serratum*.

B. In der alten Welt weit verbreitete Arten: 9.

Südafrika, Monsungebiet: *phlegmaria*, *squarrosus*.

Monsungebiet: *proliferum*, *setaceum*, *Dalhousieanum*, *carinatum*, *phyllanthum*.

Östliches Monsungebiet und australisches Gebiet: *australianum*, *varium*.

C. In der neuen Welt weit verbreitete Arten: 15.

Zentral- und Südamerika: *reflexum*, *tenue*, *tetragonum*, *dichotomum*, *sarmentosum*, *linifolium*, *struthioloides*, *myrsinites*, *aqualupianum*.

Zentralamerika: *funiforme*, *mexicanum*, *gigas*, *chamaepeuce*, *Schwendnerii*, *callitrichifolium*.

D. Arten von kleinem Verbreitungsareal (endemische Arten): 113.

4. Kontinente:

Nordamerika: 2

Extratropisches Ostasien: 3

Afrika: 5

Himalaya: 4

Tropisches Ostasien: 7

Tropisches Zentralamerika: 1

Brasilien: 14

Sektionen	Boreales Florenreich								Paläotropisches Florenreich								Zentr.- u. südamerikan. Florenreich				Australes Florenreich				
	8 Arten (7 end.) 4 Art auch im Paläotrop. F.								45 Arten (40 end.) 3 Arten auch im Z.- u. S.-Am. F. 2 Arten im Austr. F.								78 A. (75 end.)				8 Arten (6 end.)				
I II III IV V VI VII	Arkt. Gebiet								Nordaf.-ind. Wüste									Mittelamer. Xeroph.				Austr.-antarkt. S.-Am.			
	Subarkt. Geb.								Afr. Wald- u. Stepp.									Geb. d. trop. Amer.				Kerguelen			
	Mitteleurop. Geb.								Südwestl. Kapland									(Extratrop.) and. Geb.				Neuseeländ. Geb.			
	Makarones. Geb.								Südatlant. Ins.																
	Mediterrangeb.								Micromalagass.																
	Zentralasiat. Geb.								Madagaskar																
	Temperiertes Ostas.								Vorderind. Geb.																
	Pazif. Nordamer.								Monsungeb.																
	Atlant. Nordamer.								Chin.-jap. Übergangsg.																
									Geb. v. Hawaii																
	Gesamtz. d. Arten	1	2	4	2	4	4	2	3	5	7	2	7	8	6	26	7	6	78	4	.	1	3	3	4

Anden: 44
 Australien: 4.

2. Inseln:

Madeira, Réunion: 4
 Azoren: 4
 Ascension: 4
 St. Helena: 4
 Mikromalagassia: 4
 Madagaskar: 5
 Celebes: 4
 Java: 3
 Tahiti: 2

Neue Hebriden: 4
 Fidschi: 4
 Neu-Caledonien: 2
 Neu-Guinea: 4
 Hawaii: 4
 Cuba: 4
 Martinique, Guadeloupe: 2
 Trinidad: 4
 Neu-Seeland: 4
 Kerguelen: 4
 Tristan da Cunha: 2
 Falklands-Inseln: 4.

Wie aus der vorstehenden Übersicht hervorgeht, besitzt der Epiphyt *L. verticillatum* die weiteste Verbreitung. Ihm schließen sich drei Geophyten an, deren Areal sich ebenfalls über die alte und neue Welt erstreckt. Die folgenden weit verbreiteten Arten sind nur Epiphyten. Eine Ausnahme macht wiederum der ebenfalls weit verbreitete neotropische Geophyt *L. reflexum*.

Am reichsten an Endemismen ist das andine Gebiet, in welchem die Sect. *Crassistachys* zu eigentümlicher Entwicklung gelangt. Im übrigen besitzen besonders die Inseln viele endemische Arten.

Leider reichen unsere Kenntnisse noch nicht aus, um Schlüsse über die natürliche Verwandtschaft der einzelnen Arten aus der geographischen Verbreitung zu ziehen.

VI. Fossile Reste.

Von den vielen fossilen Resten, die zu den *Lycopodiales* gestellt worden sind, gehört gewiß ein großer Teil zur Untergattung *Urostachys*, doch läßt sich dies nur selten mit Sicherheit aus den mangelhaften Beschreibungen ersehen. In der Mehrzahl der Fälle ist nicht einmal angegeben, ob die Pflanze homo- oder heterospor ist, ob sie also zu den *Lycopodiaceae* oder zu den *Selaginellaceae* gehört. Dünnschliffe vollends, um die Stammanatomie zu erkennen, sind fast nie hergestellt worden.

Etwa folgende Arten glaube ich indessen schon jetzt zur Gattung *Lycopodium*, Untergattung *Urostachys* stellen zu dürfen. Ich behalte jedoch, bis eingehendere Studien darüber gemacht sein werden, den Namen *Lycopodites* Gold. 1855 (nicht BRONGNIART 1822) bei¹⁾.

1) Literatur:

GOLDENBERG, Flora Saraepontana fossilis mit Atlas. Saarbrücken 1855.

LERQUEREUX, LEO, Descr. and Atlas of Coal Flora of Pennsylvania. Harrisburg 1879
 — 1880.

DAWSON, Fossil Plants Devon and Upper Silur Format. Canada. Montreal 1874.

Präkarbon. Nord-Amerika	Karbon		<i>Lycopodites</i>
	Nord-Amerika	Europa	
		+	<i>denticulatus</i> Gold.
		+	<i>leptostachys</i> Gold.
	+		<i>pendulus</i> Lesqux.
	+		<i>Meekii</i> Lesqux.
+			<i>Matthewi</i> Dn.

Sämtliche aufgeführten Arten scheinen *Urostachya* vom Habitus der tropischen Epiphyten *L. verticillatum*, *L. squarrosus* oder *L. phlegmaria* gewesen zu sein, die heute in den Ablagerungsgebieten nicht mehr vorkommen.

Die Gabelung der *Palaeourostachya* erfolgte anscheinend nicht immer so regelmäßig bipartit, wie es bei den heutigen Arten ausnahmslos der Fall ist. Man findet alle Übergänge von der Bipartition mit gleichmäßiger zu der mit ungleichmäßiger Weiterentwicklung (cf. Fig. 4). In jener Zeit waren also möglicherweise diese heute so konstanten Merkmale noch in der Ausbildung begriffen.

In den meisten Gruppen der Urostachyen der Jetztzeit sind die Arten einander so ähnlich, daß es schwierig ist, sie auseinander zu halten. Wir haben es offenbar mit einem Geschlecht zu tun, das zwar selbst ziemlich isoliert dasteht, dessen Glieder aber unausgesetzt in Umwandlung begriffen sind. Der Umstand, daß Gruppen, die über mehrere Erdteile verbreitet sind, oft sehr nahe verwandte Arten in beiden Gebieten zeigen, scheint mir darauf hinzudeuten, daß solche Formenkreise von gemeinsamen Vorfahren abstammen und erst im Laufe der Zeit räumlich getrennt wurden. Wie bereits erwähnt, zeigen von Epiphyten *verticillatum*, *squarrosus*, *phlegmaria*, von Geophyten *selago*, *saururus*, *serratum* ein solches Verhalten. Diese Arten würden also zu den ältesten des Geschlechts gehören. Bei den drei genannten Epiphyten wird diese Vermutung noch durch das Vorkommen ähnlicher *Palaeourostachys*-Formen bestätigt. Die endemischen Arten können dagegen sehr wohl als durch Variation in gesonderten Klimaten auch in jüngerer Zeit entstandene Typen aufgefaßt werden, wie z. B. die Arten Madagaskars. Wohl sicher neueren Datums ist die ganz isoliert dastehende polymorphe Sect. II *Crassistachys* in der Cordillere Südamerikas. Die Arten dieser Sektion werden sich wahrscheinlich erst nach der Haupterhebung dieser Gebirgskette in der Tertiärperiode herausdifferenziert haben.

Lebenslauf.

Ich, Wilhelm Gustav Franz Herter, bin geboren am 10. Januar 1884 zu Berlin. Meine Eltern sind: Franz Herter, Hauptmann a. D. und Minna Herter geb. Riedel zu Groß-Lichterfelde W. Ich bin evangelischer Konfession.

Nachdem ich 2 Jahre die Vorschule des Kgl. Gymnasiums zu Spandau und 4 Jahre die des Gymnasiums zu Steglitz besucht, absolvierte ich nach 9 Jahren das Gymnasium zu Steglitz, das ich Ostern 1903 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Ich studierte hierauf die Naturwissenschaften an den Universitäten Berlin, Freiburg i. B., Montpellier und Paris. Hier belegte ich bei folgenden Herren Vorlesungen, praktische Arbeiten und Exkursionen:

Botanik: Ascherson, Bonnier, Bureau, Claußen, Diels, Dubard, Engler, Flahault, Hildebrand, Lindau, Mirande, Molliard, Oltmanns, Pavillard, Schwendener.

Zoologie: Caullery, Duboscq, Oustalet, Perrier, Pruvot, de Rouville, F. E. Schulze, Soulier, Weismann.

Geologie: Böhm, Paulcke, Steinmann.

Physik: Himstedt, Meslin, Warburg.

Chemie: Gattermann, Kiliani, Landolt, Maquenne.

Philosophie: Riehl,

sowie einige Vorlesungen aus anderen Gebieten.

Es sei mir hier gestattet, allen diesen meinen hochverehrten Lehrern, sowie allen anderen hier nicht genannten Lehrern und Freunden, die mir während meines Studienganges wohlwollend zur Seite standen, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.

Vom Mai 1906 an war ich Assistent für Botanik und Phytopathologie am Kaiser-Wilhelms-Institut für Landwirtschaft zu Bromberg, von Januar 1907 an bekleidete ich einen ähnlichen Posten an der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Montevideo (Uruguay), und seit Januar 1908 bin ich Assistent am Kgl. Botan. Museum zu Dahlem-Steglitz bei Berlin.

Die Promotionsprüfung bestand ich am 20. Juli 1908. Die Dissertation erhielt das Prädikat »laudabile«.

RECEIPTS

Received of the Treasurer of the County of ... the sum of ... Dollars for ...

Witness my hand and seal this ... day of ... 19...

By ...

...

...

...

...

...